

По вопросам

показания и дополнительным прививкам, срокам и периодичности вакцинации, побочным эффектам, длительности сохранения иммунитета против инфекции, сочетания вакцин, дополнительной информации по вакцинам обращаться к участковым педиатрам. Или по телефонам:

Заведующий педиатрическим отделением – Савина Татьяна Евгеньевна: 21-94-75

Заведующий детской поликлиникой № 2 – Печенькова Любовь Владимировна:
21-94-71

Для уточнения

наличия вакцины, стоимости, записи в лист ожидания и других организационных вопросов обращаться с 8:00 до 16:00 в кабинет № 26 или по телефону:

Старшая медицинская сестра - Кузина Татьяна Алексеевна:
21-94-72.

Календарь прививок, проводимых в детской поликлинике на платной основе (по желанию родителей)

№ п/п	Возраст	Инфекции, против которых проводится иммунопрофилактика	Вакцина на платной основе
1	2,3,4 месяца	Коклюш, дифтерия, столбняк, гемофильная палочка тип В, вирусный гепатит В, полиомиелит	Инфанрикс Гекса (6 в 1) Гексаксим (6 в 1)
2	С 1,5 месяцев	Пневмококковая инфекция	Превенар 13
3	С 6 месяцев	Грипп	Ваксигрипп тетра
4	С 9 месяцев	Менингококковая инфекция (серотипы А, С, Y, W-135)	Менактра
5	С 12 месяцев	Ветряная оспа	Варилрикс
		Вирусный гепатит А	Хаврикс
		Клещевой энцефалит	Тиковак джуниор, Тиковак
6	18 месяцев	Коклюш, дифтерия, столбняк	Инфанрикс

Инфанрикс, Инфанрикс Гекса, Гексаксим содержат бесклеточный компонент для вакцинации против коклюша. Поэтому у этих вакцин меньше вероятность развития побочных эффектов. Вакцины Инфанрикс Гекса, Гексаксим позволяет провести иммунопрофилактику одним уколом.

Схема вакцинации:

Инфанрикс Гекса, Гексаксим в возрасте 2,4,6 месяцев.

Инфанрикс – в качестве ревакцинации против коклюша, дифтерии, столбняка в возрасте 18 месяцев.

Превенар 13 позволяет создать иммунитет против самых распространенных и агрессивных пневмококков – это профилактика отитов, пневмонии, менингита.

Схемы вакцинации:

6 недель – 6 месяцев: 3-кратная вакцинация с интервалом в 1 месяц, ревакцинация в 11-15 месяцев;

7-11 месяцев: 2-кратная вакцинация с интервалом в 1 месяц, ревакцинация на втором году жизни;

1-2 года: 2-кратная вакцинация с интервалом в 2 месяца;

2-17 лет: 1-кратная вакцинация.

Ваксигрипп Тетра – четырехвалентная вакцина против гриппа типа А и В (Гриппол плюс – трехвалентная вакцина).

Схема вакцинации:

Впервые вакцинируемые от гриппа дети с возраста 6 месяцев до 9 лет – 2-кратная вакцинация с интервалом в 4 недели.

Повторная вакцинация от гриппа, дети старше 9 лет – однократная вакцинация.

Менактра – вакцина против менингококковой инфекции (серотипы А, С, Y, W-135). Менингококковая инфекция является одной из самых грозных инфекций, приводящих к развитию менингита, менингоэнцефалита. Часто имеет молниеносное течение и может приводить к летальному исходу.

Схема вакцинации:

Дети в возрасте 9-23 месяцев – 2-кратная вакцинация с интервалом 3 месяца.

Дети старше 2-х лет – однократная вакцинация.

Варилрикс – вакцина против ветряной оспы. К счастью редко, но ветряная оспа может протекать тяжело, приводя к серьезным осложнениям: бактериальный сепсис, воспаление легких, энцефалит, инсульт. Кроме этого, вакцинация позволит избежать такого заболевания как «опоясывающий лишай» в зрелом возрасте (вызывается этим же вирусом при снижении иммунитета).

Схема вакцинации:

Дети с возраста 1 года – 2-хкратная вакцинация с интервалом 6 недель.

Хаврикс – вакцина против вирусного гепатита А. Особенно актуально для семей, выезжающих с детьми за пределы Республики Беларусь.

Схема вакцинации:

Дети с возраста 1 года – однократная вакцинация с ревакцинацией через 6-12 месяцев.

Тиковак (для детей старше 15 лет), **Тиковак джуниор** (с года до 15 лет) – вакцина против клещевого энцефалита. Укусы клещей остаются актуальной ежегодной проблемой. Клещевой энцефалит не имеет специфического лечения.

Схема вакцинации:

Дети с возраста 1 года – трехкратная вакцинация, с интервалом между первой и второй 1-3 месяца, между второй и третьей – 5-12 месяцев.

Первая ревакцинация через 3 года, далее – каждые 5 лет.

Гардасил, Церварикс – вакцины против папилломавирусной инфекции. Вакцина формирует иммунитет против нескольких типов вируса, которые являются онкогенными. На данный момент – самая эффективная профилактика рака шейки матки.

Схемы вакцинации:

Девочки с возраста 9 лет: 3-хкратная вакцинация с интервалом между первой и второй 1 месяц, между второй и третьей – 5 месяцев.

